



CTX-370 PASTILHAS DE TRICLORO

Composto orgânico de dissolução lenta, altamente estabilizado, para a desinfecção e manutenção da água cristalina e higienicamente pura.

PROPRIEDADES

Aspecto	Sólido em pastilhas de 200 gr
Cor	Branco
pH (a 1%)	2-3
Conteúdo em cloro útil	90%
Solubilidade	1,2 gr/100 ml
Humidade	0,30%

COMPOSIÇÃO

– Ingredientes Activos (por 1.000 gr):

Tricloro -1,3,5 – Triazinatriona $\text{Cl}_3(\text{NCO})_3$ 996 gr

DOSAGEM

Tratamento inicial:

Adicionar 15 gr de CTX-200/GR ou 2 pastilhas de CTX-250 por cada m^3 de água.
Passadas 2 horas, ajustar o pH da água entre 7,2 - 7,6 utilizando CTX-10 ou CTX-20.

Tratamento de manutenção:

Com o pH da água ajustado, o tratamento de manutenção pode efectuar-se de duas formas diferentes:

A) Colocar nos cestos dos skimmers 1 pastilha de CTX-370 por cada 15 m^3 de água, cada 7 dias.

B) Nas instalações onde se utilize doseador, enchê-lo de pastilhas de CTX-370 e, a seguir, fazer circular a água através do doseador.

Estas doses são orientativas e podem ser alteradas em função das características próprias de cada piscina, climatologia, etc.

O tratamento inicial (Supercloração) deverá repetir-se sempre que se verifique uma falta de transparência da água.



MODO DE EMPREGO

Introduzir a dose necessária de CTX-370 no interior de um skimmer ou doseador, pondo, a seguir, o equipamento do filtro a funcionar, para desta maneira dissolver o produto, ao circular a água através do skimmer ou doseador.

É indispensável que todo o volume de água da piscina seja recirculado, diariamente, através do filtro.

O cloro residual livre deverá estar situado entre 0,5-2 mg/Lt valor que se medirá facilmente utilizando um estojo analisador de cloro e de pH. Este controlo deverá efectuar-se no mínimo 2 vezes ao dia.

RECOMENDAÇÕES

- Manter a passagem da água totalmente aberta nos skimmers e sarjetas durante o processo de filtração.
- Manter os cestos dos skimmers limpos (folhas, papel, etc) para se obter uma boa dissolução das pastilhas.
- É aconselhável introduzir uma nova dose de CTX-370 quando as pastilhas que se encontram no interior dos skimmers tenham ficado reduzidas a 10% do peso inicial.

APRESENTAÇÃO

Em embalagens de 1, 5, 10, 25 e 50 Kg.

PRECAUÇÕES

RISCOS ESPECIFICOS:

R 8:Perigo de incêndio em contacto com materiais combustíveis.

R 22:Nocivo em caso de ingestão.

R 31:Em contacto com ácido liberta gás tóxico.

R 36/37:Irritante os olhos e vias respiratórias.

CONSELHOS DE PRUDÊNCIA:

S 8:Conservar o recipiente ao abrigo da humidade.

S 26:Em caso de contacto com os olhos, lavá-los imediata e abundantemente com água e ir ao médico.

S 41:Em caso de incêndio ou explosão, não respire os fumos.

«Atenção! Não misturar com outros produtos, podem soltar-se gases perigosos (cloro)»

Deve-se evitar o contacto prolongado do CTX-370 sobre as superfícies do tanque, em piscinas fabricadas com poliéster, liner, vinil ou pintadas, pois este produto produz a descoloração dessas superfícies.

EFEITOS TOXICOLÓGICOS

- Não irrita a pele seca, mas sim as mucosas respiratórias e sobretudo os olhos.
- A dose letal para ratos (LD₅₀) é estabelecida num mínimo de 0,60 gr/Kg de peso.

EM CASO DE ACIDENTE OU DE INDISPOSIÇÃO, CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MÉDICO (mostrar-lhe o rótulo, se possível).